

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению лекарственного препарата  
для медицинского применения  
**ФУРАЦИЛИН**

**Регистрационный номер:** ЛСР-009026/10

**Торговое наименование препарата:** ФУРАЦИЛИН

**Международное непатентованное название:** нитрофурал

**Лекарственная форма:** таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения.

**Состав:**

Состав на одну таблетку:

*активное вещество:* нитрофурал (фурацилин) – 20 мг;

*вспомогательные вещества:* натрия хлорид – 800 мг.

**Описание**

Таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета, с неравномерной окраской поверхности, плоскоцилиндрические с риской и фаской.

**Фармакотерапевтическая группа:** противомикробное средство – нитрофуран.

**Код АТХ [D08AF01]**

**Фармакологическое действие**

Противомикробное средство. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Escherichia coli*, *Clostridium perfringens*). Эффективен при устойчивости микроорганизмов к другим противомикробным средствам (не из группы нитрофурана). Обладает отличным от других химиотерапевтических средств механизмом действия: микробные флавопротеины восстанавливают 5-нитрогруппу, образуя высокореактивные аминопроизводные изменяют конформацию белков, в том числе рибосомальных, и других макромолекул, вызывая гибель клеток. Устойчивость развивается медленно и не достигает высокой степени.

**Фармакокинетика**

При местном и наружном применении всасывание незначительное. Проникает через гистогематические барьеры и равномерно распределяется в жидкостях и тканях. Основной путь метаболизма – восстановление нитрогруппы. Выводится почками и частично с желчью.

**Показание к применению**

Наружно: гнойные раны, пролежни, ожоги II – III ст., мелкие повреждения кожи (в том числе ссадины, царапины, трещины, порезы).

Местно: блефарит, конъюнктивит, фурункул наружного слухового прохода; остеомиелит, эмпиема околоносовых пазух, плевры (промывание полостей); острый наружный и средний отит, ангина, стоматит, гингивит.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность, кровотечения, аллергодерматозы.

**Применение при беременности и лактации**

Допускается применение при беременности и лактации.

**Способ применения и дозы**

Местно, наружно.

Наружно, в виде водного 0.02% (1:5000) или спиртового 0.066% (1:1500) растворов – орошают раны и накладывают влажные повязки.

Внутриполостно (водный раствор): эмпиема придаточных пазух носа (в т.ч. при гайморите) – промывание полости; остеомиелит после операции – промывание полости с последующим наложением влажной повязки; эмпиема плевры – после удаления гноя проводят промывание плевральной полости и вводят 20-100 мл водного раствора. Для промывания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря применяют водный раствор с экспозицией 20 мин. При отитах – спиртовой раствор, нагретый до температуры тела, ежедневно закапывается по 5-6 капель в наружный слуховой проход. Блефарит, конъюнктивит – инстилляцией водного раствора в конъюнктивальный мешок.

Для полоскания рта и горла – 20 мг (1 таблетка) растворяют в 100 мл воды. Для приготовления водного раствора 1 часть нитрофурала растворяют в 5000 частей 0.9% раствора натрия хлорида или дистиллированной воды. Спиртовой раствор готовят на 70% этаноле.

**Побочное действие**

Возможны аллергические реакции: кожный зуд, дерматит.

**Передозировка**

О случаях передозировки не сообщалось.

**Взаимодействие**

Взаимодействие с другими лекарственными средствами не описано.

**Форма выпуска**

Таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения, 20 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку.

По 30 таблеток в банку из полимерных материалов.

По 1 или 2 контурные ячейковые упаковки или 1 банку из полимерных материалов с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения.**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности.**

5 лет.

По истечении срока годности препарат не применять.

**Условия отпуска из аптек.**

Без рецепта.

**Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение**

ОАО «Авексима»

125284, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1.

**Производитель/организация, принимающая претензии**

ООО «Авексима Сибирь».

652473, Россия, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Герцена, д. 7.

Тел./факс: (38453) 5-23-51.